

TEPPEKI®

Insekticīds

Selektīvs sistēmas iedarbības insekticīds laputu ierobežošanai ziemas kviešu, speltas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas miežu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu, cukurbiešu, galda biešu, lopbarības biešu un zirņu (zaļie bez pākstīm) sējumos, krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kartupeļu, galviņkāpostu, Briseles kāpostu, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.

Reģistrācijas klase: 2

Darbīgā viela: flonikamīds 500 g/kg

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Iepakojums: 10x0,5 kg, 4x 2 kg

Reģistrācijas numurs: 0699

Partijas numurs/ izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.



Uzmanību

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

EUH401 – Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P305 + P351+ P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību

P501 – Atbrīvojies no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli. Netūrīt lietošanas iekārtas ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - tālruna Nr.: 112

Uzglabāšana:

Uzglabāt slēgtā, sausā, vēsā, labi vēdināma noliktavā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0° C līdz +32° C. Sargāt no mitruma, sala un tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas īpašnieks/ ražotājs:

ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B-box9
B-1831 Diegem, Belgium
Tel.: +322 62 78611
www.iskbc.com

Importētājs un izplatītājs Latvijā:

SIA BALTIC AGRO
Bauskas iela 58a,
LV-1004 Rīga, Latvija
Tel.: +371 67 228851
Fax.: +371 67 830280
www.balticagro.lv

AGRIMATCO LATVIA SIA
Tīraines iela 5c,
LV- 1058 Rīga, Latvija
Tel.: +371 67 80 7711
Fax.: +371 67 67 2217
www.agrimatco.lv

SIA KG LATVIA
Šķūņu iela 2, Siguldas pagasts,
LV-2150 Siguldas novads, Latvija
Tel.: +371 67 976277
Fax.: +371 67 976278
www.kglatvija.eu

SIA SCANDAGRA LATVIA
Vienības gatve 109,
LV-1058 Rīga, Latvija
Tel.: +371 63 407196
Fax.: +371 63 407197
www.scandagra.lv

SIA LINAS AGRO
„Baltijas Ceļš“, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV 3043,
Latvija
Tel.: +371 63 084024
Fax.: +371 63 084224
www.linasagro.lv

TEPPEKI®

Insekticīds

Selektīvs sistēmas iedarbības insekticīds laputu ierobežošanai ziemas kviešu, speltas kviešu, ziemas tritikāles, ziemas miežu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, auzu, cukurbiešu, galda biešu, lopbarības biešu un zirņu (zaļie bez pākstīm) sējumos, krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kartupeļu, galviņkāpostu, Briseles kāpostu, ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.

Reģistrācijas klase: 2

Darbīgā viela: flonikamīds 500 g/kg

Preparatīvā forma: disperģējamas granulas

Iepakojums: 0,5 kg, 2 kg

Reģistrācijas numurs: 0699

Partijas numurs/ izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.



Uzmanību

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

EUH401 – Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P305+ P351+ P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnisku palīdzību.

P501 – Atbrīvojies no satura/ tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli. Netīrīt lietošanas iekārtas ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - tālruna Nr.: 112

Uzglabāšana:

Uzglabāt slēgtā, sausā, vēsā, labi vēdināma noliktavā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0° C līdz +32° C. Sargāt no mitruma, sala un tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas īpašnieks/ ražotājs:

ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, DeKleetlaan12B-box9
B-1831 Diegem, Belgium
Tel.: +322 62 78611
www.iskbc.com

Importētājs un izplatītājs Latvijā:

SIA BALTIC AGRO
Bauskas iela 58a,
LV-1004 Rīga, Latvija
Tel.: +371 67 228851
Fax.: +371 67 830280
www.balticagro.lv

SIA SCANDAGRA LATVIA
Vienības gatve 109,
LV-1058 Rīga, Latvija
Tel.: +371 63 407196
Fax.: +371 63 407197
www.scandagra.lv

AGRIMATCO LATVIA SIA
Tīraines iela 5c,
LV- 1058 Rīga, Latvija
Tel.: +371 67 80 7711
Fax.: +371 67 67 2217
www.agrimatco.lv

SIA LINAS AGRO
„Baltijas Ceļš“, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3043,
Latvija
Tel.: +371 63 084024
Fax.: +371 63 084224
www.linasagro.lv

SIA KG LATVIA
Šķūņu iela 2, Siguldas pagasts,
LV-2150 Siguldas novads, Latvija
Tel.: +371 67 976277
Fax.: +371 67 976278
www.kglatvija.eu

Pirmā palīdzība

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Novilkt aptraipīto apģērbu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalot muti ar ūdeni. Neizsaukt vemšanu.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā, novietot tādā pozā, lai ir viegli elpot, ļaut atpūsties.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Ja iespējams, uzrādiet attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzer un nesmēķēt darbojoties ar vielu. Strādāt ar preparātu tikai labi vēdināmās vietās. Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: ūdensnecaurlaidīgu, ķīmiski izturīgu aizsargtērpu, ūdensnecaurlaidīgus, ķīmiski izturīgus gumijas cimdus un

slēgtus gumijas apavus, aizsargbrilles, respiratoru. Aizskarot aptraipītas virsmas, valkāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargapģērbu. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Preparāta raksturojums:

TEPPEKI ir selektīvs sistēmas iedarbības insekticīds, kas iedarbojas uz visām izplatītākajām laputu sugām graudaugos, kartupeļos, zirņos, cukurbietēs, galda bietēs, lopbarības bietēs, galviņkāpostos, Briseles kāpostos, krāšņumaugos, ķiršos, plūmēs, ābelēs un bumbierēs.

TEPPEKI iedarbojas sistēmiski, un darbīgā viela flonikamīds pārvietojas augā augšupejošā un lejupejošā plūsmā. Darbīgajai vielai ir arī translamināra efektivitāte, tā spēj pārvietoties no lapas virspuses uz apakšpusi, iedarbojoties arī uz tām laputīm, kas paslēpušās zem lapām.

TEPPEKI aptur laputu barošanos jau dažas stundas pēc tā lietošanas, laputis vairs nespēj baroties un iet bojā dažu dienu laikā. Lai arī pilnīga produkta efektivitāte un laputu bojāeja novērojama 4-6 dienas pēc tā lietošanas, augi vairāk netiek bojāti jau apstrādes dienā. Lietojot pilnu produkta devu, iedarbība saglabājas līdz pat 4 nedēļām. Produkta efektivitāti neietekmē augstas vai zemas gaisa temperatūras.

Lietošana:

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva, kg/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, speltas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši	Labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), rožu -graudzāļu laputs (<i>Metopolophium dihodum</i>), ievu-auzu laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	0.10-0.14	Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77)	28	2
Ziemas mieži, vasaras mieži, auzas	Labību laputs (<i>Sitobion avenae</i>), rožu -graudzāļu laputs (<i>Metopolophium dihodum</i>), ievu-auzu laputs (<i>Rhopalosiphum padi</i>)	0.10-0.14	Apsmidzināt sējumus pavasarī/vasarā kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz vēlajai piengatavībai (AS 21-77)	28	1
Zirņi (zaļie bez pākstīm)	Zirņu laputs (<i>Acyrtosiphon pisum</i>), pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>), persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>)	0.14	Apsmidzināt sējumus kaitēkļiem parādoties, sākot ar kultūruauga 6 lapu stadiju līdz pākstis sasniegušas 10% no izmēra (AS 16-71)	14	1
Kartupeļi	Persiku laputs	0.16	Apsmidzināt	21	2

	(<i>Myzus persicae</i>), pabērzu laputs (<i>Aphis nasturtii</i>), kartupeļu laputs (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>), krūkļu laputs (<i>Aphis frangulae</i>)		stādījumu kaitēkļiem parādotes, sākot ar bumbuļu briešanas sākumu līdz bumbuļu briešanas beigām (AS 40-49)		
Ābeles, bumbieres	Ābeļu zaļā laputs (<i>Aphis pomi</i>), rožu-ābeļu laputs (<i>Dysaphis plantaginea</i>), bumbieru madaru laputs (<i>Dysaphis pyri</i>)	0.14	Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādotes, sākot ar ģeneratīvo pumpuru briešanas sākumu līdz augļi sasnieguši apmēram pusi no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 51-75)	21	3
Ķirši*	Persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>), ķiršu-madaru laputs (<i>Myzus cerasi</i>)	0.14	Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādotes, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71)	14	2
Plūmes*	Laputis (<i>Aphididae</i>), plūmju-niedru laputs (<i>Hyalopterus pruni</i>), plūmju- apiņu laputs (<i>Phorodon humuli</i>)	0.14	Apsmidzināt stādījumus, kaitēkļiem parādotes, sākot ar ģeneratīvo pumpuru plaukšanu līdz augļaizmetņu attīstības sākumam (AS 51-71)	21	2
Galviņkāposti*, Briseles kāposti*	Kāpostu laputs (<i>Brevicoryne brassicae</i>), kāpostu baltblusiņa (<i>Aleyrodes proletella</i>)	0.14	Apsmidzināt stādījumu, kaitēkļiem parādotes, sākot ar kultūrauga trīs lapu stadiju līdz galviņa sasniegusi 50% no šķirnei raksturīgā lieluma (AS 13-45)	14	2
Krāšņumaugi*	Laputis (<i>Aphididae</i>)	0.14	Apsmidzināt, kaitēkļiem parādotes.	-	3
Cukurbietes, galda bietes*, lopbarības bietes*	Pupu laputs (<i>Aphis fabae</i>), persiku laputs (<i>Myzus persicae</i>)	0.14	Apsmidzināt sējumus kaitēkļiem parādotes, sākot ar kultūrauga 6 lapu stadiju līdz izveidojusies sakne (AS 16-49)	60	1

***Mazais lietojums.** Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo efektivitātes trūkumu kaitīgo organismu ierobežošanā un par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīmes:

Labībām, kartupeļiem, ja laputis jau izplatījušās sējumos vai stādījumā, veic divas apstrādes, ievērojot 3 nedēļu intervālu starp apstrādēm.

Labībām smidzinājumam var izvēlēties mazāko produkta devu, ja visi apstākļi ir optimāli. Efektivitāte grūtāk prognozējama, ja laputis izplatījušās uz augu zemākajām daļām.

Zirņiem labākai efektivitātei, vēlajos smidzinājumos, smidzinājuma kvalitātes uzlabošanai vēlams izmantot papildus virsmas aktīvo vielu.

Ābeles un bumbieres smidzina ne vairāk kā 3 reizes sezonā, ar 3 nedēļu intervālu.

Plūmēm un ķiršiem var veikt divas apstrādes sezonā, ievērojot 21 dienu intervālu starp apstrādēm.

Galviņkāpostiem var veikt divas apstrādes sezonā, ievērojot 14 līdz 21 dienu intervālu starp apstrādēm.

Krāšņumaugiem var veikt trīs apstrādes sezonā, ievērojot 21 dienu intervālu starp apstrādēm.

Bītes un citi apputeksnētāji:

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bītes un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bītes aktīvi meklē barību.

Vietas, kur bītes aktīvi meklē barību, ietver arī gadījumu, kad ir novērojama jebkāda aktīva bišu darbība apstrādājamajā platībā, piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus esošu teritoriju barības ievākšanai

Ūdens daudzums:

Ziemas un vasaras, speltas kvieši, tritikāle, rudzi, ziemas un vasaras mieži, auzas: 150-300 l/ha.

Zirņi (zaļie bez pākstīm), cukurbietes, galda bietes, lopbarības bietes: 200-400 l/ha.

Kartupeļi: 200-500 l/ha, ūdens daudzums atkarīgs no kartupeļu attīstības stadijas.

Galviņkāpostiem: 200-300 l/ha.

Ābeles, bumbieres, plūmes, ķirši un krāšņumaugi: 200-1000 l/ha, ūdens daudzums atkarīgs no koku lieluma, lapu virsmas, un izmantotā smidzināšanas aprīkojuma.

Darba šķidruma sagatavošana:

Pirms smidzināšanas pārbaudīt visas šļūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārlicināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai iegūtu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni un pievieno nepieciešamo TEPPEKI daudzumu tvertnē, maisot pievieno atlikušo vajadzīgo ūdens daudzumu. Sagatavot tikai tūlītējai izsmidzināšanai nepieciešamo darba šķidruma daudzumu. Gatavojot tvertnes maisījumus, aizliegts jaukt kopā koncentrātus; katrs produkts jāpievieno smidzinātāja tvertnē atsevišķi. Sagatavot tikai tūlītējai izsmidzināšanai nepieciešamo darba šķidruma daudzumu un uzreiz to izlietot.

Rezistences veidošanās riska ierobežošana :

Teppeki satur darbīgo vielu flonikamīds, pieder 29 grupai pēc IRAC klasifikācijas. Pašreiz flonikamīds ir vienīgā darbīgā viela šajā grupā.

Vienā sezonā, atkarībā no kultūrauga var veikt vienu līdz trīs smidzinājumus. Nepārsniegt ieteicamo apstrāžu skaitu sezonā un ievērot reģistrēto devu. Krāšņumaugiem, ābelēm un bumbierēm neveic vairāk kā 2 smidzinājumus pēc kārtas. Ja nepieciešams veikt vairāk, kā 2

apstrādes, izmanto insekticīdus ar atšķirīgu iedarbības mehānismu, rezistences riska mazināšanai. TEPPEKI aizsargājošā iedarbība ilgst 14-21 dienas.

Tukšais iepakojums:

Tukšā tara jāizskalo ar ūdeni 3 reizes un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma sagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot atkārtoti. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības:

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netūrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana:

Uzglabāt slēgtā, sausā, vēsā, labi vēdināma noliktavā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāšanas temperatūra no 0° C līdz +32° C. Sargāt no mitruma, sala un tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma, glabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

Juridiskā atbildība:

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika, u.tml. Produkta ražotājs neatbild par augstāk minētajiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava produkta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz produkta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā produkta uzglabāšana un lietošana ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.